

## **Wichtige Hinweise (Pflichtangaben):**

**Mucedokehl D5 Flüssige Verdünnung.** Wirkstoff: Mucor mucedo D5. Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Mucedokehl D5 Flüssige Verdünnung  
Wirkstoff: Mucor mucedo D5  
Homöopathisches Arzneimittel

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Mucedokehl D5 nicht anwenden?

Nicht anwenden bei:

- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Mucor mucedo),
- Autoimmunerkrankungen,
- Kindern unter 12 Jahren,
- Schwangerschaft und Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Mucedokehl D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten. Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

Wie lange sollten Sie Mucedokehl D5 anwenden?

Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Mucedokehl D5 abgesetzt werden. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet/eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:**

Aufgrund des Gehaltes von Mucedokehl D5 an spezifischen organischen Bestandteilen können Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Mucor mucedo ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen. Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

**Zusammensetzung:**

10 ml flüssige Verdünnung enthalten: Wirkstoff: 10 ml Mucor mucedo D5 dil. (HAB, Vorschrift 5a).

**Darreichungsform und Inhalt:**

10 ml / 10 x 10 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen und Einreiben.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

SANUM-KEHLBECK GmbH & Co. KG

Postfach 1355

D-27316 Hoya

Tel.: (04251) 93520

Fax: (04251) 9352291

E-Mail: [info@sanum.com](mailto:info@sanum.com)

Stand der Gebrauchsinformation: März 2013.

Quelle: Angaben der Packungsbeilage

Stand: 05/2016